

START antifosfolipidi

V Pengo

Caratteristiche cliniche

- Età*
- Sesso*
- Peso*
- Altezza*
- BMI*
- Etnia*
- Ipertensione arteriosa* SI - NO
- Diabete mellito* SI - NO
- Dislipidemia* SI - NO
- Terapia con estrogeni/progestinici* SI - NO
- Altri fattori di rischio trombotico* SI - NO
- Fumo di sigaretta* SI - NO

* indica i dati necessari la cui assenza determina esclusione del caso dal registro.

Trombosi o perdite gravidiche

Trombosi arteriose* SI-NO

Sede data

Trombosi Venose* SI-NO

Sede data

Sindrome catastrofica* SI-NO

Organi interessati _____

- Aborti < 10 WG* SI – NO (numero)
- > 1 aborto > 10 WG* SI - NO
- Pre-eclampsia* SI - NO
- Parto pre-termine per insuff.placentare* SI- NO

- Piastrinopenia (<100 x 10⁹L-1) SI - NO
- Anemia emolitica SI - NO
- Valvulopatia cardiaca SI - NO
- Livedo reticularis SI - NO
- Nefropatia APS associata SI – NO
- Altre patologie autoimmuni SI – NO _____

Diagnosi

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| • aCL IgG* | Valori Normali |
| • aCL IgM* | Valori Normali |
| • anti-beta2GPI IgG* | Valori Normali |
| • anti-beta2GPI IgM* | Valori Normali |
| • LA* POS – NEG – DUBBIO | dRVVT, SCT. Altri test |

Test dopo almeno 12 settimane

- aCL IgG* Valori Normali
- aCL IgM* Valori Normali
- anti-beta2GPI IgG* Valori Normali
- anti-beta2GPI IgM* Valori Normali
- LA* POS – NEG – DUBBIO dRVVT, SCT. Altri test

DIAGNOSI: APS primitiva APS secondaria Sindrome catastrofica

Farmaci assunti al momento del prelievo* _____

Stoccaggio del Plasma

In corso di conferma della positività dopo almeno 12 settimane dal prelievo iniziale, il medico di laboratorio o del centro deve stoccare a -70C° una quantità di plasma (minimo 1ml) in due o più provette da 0.5ml ciascuna.

Tale plasma serve per confermare il dato in un laboratorio di riferimento e per studi collaborativi proposti da qualsiasi centro partecipante.